



TWYDIL® GROWING

Aliment complémentaire pour chevaux en croissance entre le sevrage et le débouillage.
Le TWYDIL® GROWING contribue au développement optimal du jeune cheval et aide à renforcer la flore intestinale.

Composition

Prémélange de vitamines, d'acides aminés et d'oligo-éléments, son de blé, graines de lin cuites, pulpes de pomme, hydrolysate de protéines de poisson, fructo-oligosaccharides (FOS), oxyde de magnésium, huile de soja

Constituants analytiques

Protéine brute 31 %, matières grasses brutes 11 %, cellulose brute 4,2 %, cendres brutes 11 %, humidité 7,5 %, magnésium 1,5 %, sodium < 1 %

Additifs (par kg)

Additifs nutritionnels

Vitamine A (rétinol)	400 000 U.I.	Thréonine	30 000 mg
Vitamine D ₃ (cholécalférol) (3a671)	40 000 U.I.	Cuivre (E4)	800 mg
Vitamine E (dl- α -tocophérol acétate)	13 333 mg	Sulfate cuivrique, pentahydraté (400 mg)	
Vitamine K ₃ (ménadione)	66 mg	Chélate cuivreux de glycine, hydraté (400 mg)	
Vitamine B ₁ (thiamine hydrochloride)	560 mg	Fer (E1)	5 600 mg
Vitamine B ₂ (riboflavine)	233 mg	Sulfate ferreux, monohydraté (2800 mg)	
Vitamine B ₆ (pyridoxine hydrochloride)	200 mg	Chélate ferreux de glycine, hydraté (2800 mg)	
Vitamine B ₁₂ (cyanocobalamine)	10 mg	Manganèse (E5)	1 800 mg
Acide nicotinique	600 mg	Oxyde manganéux (1000 mg)	
Pantothénate de calcium	250 mg	Chél. de manganèse de glycine,hydraté (800 mg)	
Biotine	10 mg	Zinc	2 600mg
Acide folique	966 mg	Oxyde de zinc (3b603) (1000 mg)	
Choline	6 500 mg	Chélate de zinc de glycine, hydraté(3b607) (1600mg)	
Vitamine C (35% ac. asc./65% asc.ester)	10 000 mg	Cobalt (3b303), carbonate de cobalt, monohydraté	24 mg
L-Lysine	70 000 mg	Iode (E2), iodate de calcium, hexahydraté	74 mg
Méthionine	30 000 mg	Sélénium (E8), selenite de sodium	29 mg
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i> (CBS493.94)	10 ¹¹ UFC

Mode d'emploi

Mélanger à la ration normale:

Quantité journalière:

(doseur de 40g inclus dans le conditionnement)

Poulains:

- de 3 mois au sevrage	20 g	(1/2 doseur)
- du sevrage à un an	40 g	(1 doseur)
Yearlings jusqu'au débouillage:	60 g	(1 1/2 doseurs)
2 ans ou plus, pas encore débouillé:	80 g	(2 doseurs)

Après le débouillage, il convient de remplacer le TWYDIL® GROWING par le TWYDIL® COURSE.

Ne pas dépasser la quantité journalière recommandée.

Ne pas utiliser concomitamment d'autres produits contenant du cobalt chez les chevaux pouvant être soumis à un contrôle antidopage.

A conserver dans son emballage original à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Refermer le couvercle après chaque utilisation. Tenir hors de portée des enfants.

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit satisfait à la réglementation locale.

PAVESCO AG, CH-4010 Bâle, No d'enregistrement: CH 11712/CH-BL-ABP005

Distributeur CE enregistré:

PAVESCO UK LTD, GB-Harleston/Norfolk, No d'enregistrement: GB 2260273

Producteur: α CH 31246